



Nematoder

Følgeseddel/ bestilling

Indsender Information*	
Dato:	
Navn:	
Adresse:	
Postnr.:	By:
☒ Resultat pr. e-mail:	
Telefonnummer:	☐ kopi til @ /Kundenummer:

Prøveoplysninger		
Prøvemærkning:		Antal prøver:
Dato for udtagning:	dd.mm.åå	Jordtypekode:
Udtagningsdybde:	cm	Aktuel afgrøde:
Areal for prøvetagn.:	ha	Tidligere afgrøde:

Analysepakker									
Frit-levende nematoder		Indsend	DK	NL	Cyste nematoder		Indsend	DK	NL
☐	Frit-levende nematoder	1 L jord	DR471	BKA	☐	Kartoffelcystenematoder(PCN)	0,6L jord	DR481	303
☐	Frit-levende nematoder+LX	1,5 L jord	DR472	BK1	☐	Roecysteneamtoder	1 L jord	DR482	201
☐	Frit-levende nematoder+cyster	1,5 L jord	DR473	BK2	☐	Alle cystenematoder	1 L jord	DR483	200
☐	Frit-levende nematoder+LX+cyster	1,5 L jord	DR474	BK3	Tillægsanalyser kun mulig med 303 og 200				
☐	Meloidogyne (rod-galle)	1 L jord	DR475	BKM	☐	Artsbestemmelse af Globodera spp.		DR484	
☐	Pratylenchus (rod-sår)	1 L jord	DR477	BKP	☐	TAT 5 arbejdsdage		DR485	
☐	NematodeCheck	1 L jord	DR494	BKC	☐	TAT 10 arbejdsdage		DR486	
					Øvrige				
Tillægsanalyser					☐	Hvidråd (Sclerotium cepivorum)		DR487	011
☐	Inkubation		DR479		☐	Stængelnematode		DR528	510
☐	Rodmateriale	Rodmateriale	DR480		☐	Stængelnematode+hvidråd		DR529	512

Nr.	Mærkning (max. 25 tegn)	Afgr.kode	Nr.	Mærkning (max. 25 tegn)	Afgr.kode
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		



Jordbundstype kode

Angiv kode for jordbundstype på forsiden af den bestillingsseddel

Kode	Type
0	Kalkholdigt sand
10	Sand
20	Lerblandet sand
30	Ler
62	Humusjord

Afgrødekoder

Anbefaling inkluderer risikovurdering af afgrødeskade samt værtsplantestatus for afgrøderne (hvis kendt).

Kode	Afgrøde	Kode	Afgrøde
SMS	Majs	CSA	Kartofler (konsum)
HVR	Havre	FBA	Kartofler (industri)
WTR	Rug	PAA	Læggekartofler
ZMG	Vårbyg	VDB	Foderroer
WGT	Vinterbyg	SKB	Sukkerroer
ZMT	Vårhvede	KZD	Raps
WTT	Vinterhvede	LZN	Lucerne
KVR	Kløver	WPN	Gulerod
GLD	Græs	PRI	Porre
APL	Æble	ZUE	Løg
BKG	Nåletræ	ABE	Jordbær

Forklaring til "Tillægsanalyser"

Inkubation

Analysen inkluderer det organiske materiale i jordprøven. Nematoder bliver ekstraheret fra det organiske materiale over en 2-ugers periode. Endoparasitiske nematoder (primært *Pratylenchus* og *Moliodogyne*) som lever i rødder tælles derved med i analysen, hvilket giver et mere præcist mål for forekomsten af nematoder

Rodmateriale

Udtages prøven i vækstsæsonen, anbefaler vi at du medsender rodmaterialer fra den aktuelle

afgrøde. Endoparasitiske nematoder kan forekomme i rødderne i stort omfang.

Vejledning til udtagning af jordprøven

- Opdel marken ved brug af markører
- Tag 1-3 prøver pr ha (1 pr. ha. for almindelige landbrugsafgrøder og 3 pr. ha for gartneri og andre højtstående afgrøder)
- Gå i en lige linje langs med pløjeretningen
- Udtag 60-70 stik pr. prøve i 0-25cm dybde
- Fyld prøveposen med 1-1½L jord
- Kartoffelcystenematoder: udtag 30 stik i 5-10 cm dybde/samlet jordmængde 0,6L

Bemærk

- Undgå prøvetagning under meget tørre forhold
- Det bedste tidspunkt for prøvetagning er efter høst af værtsplanter og jordbearbejdning
- Udtages prøven i vækstsæsonen anbefales det at der laves inkubation – rodmateriale medsendes
- Gå ikke på kompromis med prøvetagningsintensiteten. Det er bedre at fokusere på et mindre areal end at sprede stikkene over et større areal.
- Opbevaring og transport
- Opsaml prøven i en plastikpose
- Skriv prøvenummer og evt. mærkning tydeligt på posen, således at det stemmer overens med bestillingssedlen
- Luk posen tæt så prøvematerialet ikke tørrer ud
- Opbevar prøven køligt og mørkt til den sendes
- Undgå stød
- Send prøven til laboratoriet hurtigst muligt

Send prøven til

Eurofins Agro

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Tlf: 7660 4242

E-mail: hol-agro@ftn.eurofins.com