

Följsedel

Nematoder

Kundinformation *obligatoriska			
Kundnummer hos Eurofins:		Person- / Org.nummer: *Obligatoriskt	
Namn*:		Telefon*:	
Kontaktperson:		E-post:	
Adress*:		Kopimottagare e-post:	
Postadress*:		Fakturaadress: (om annan än ovan)	
Analysrapport och faktura sänds via e-post			
Önskar E-faktura, ange GLN/fakturaref:		Önskar rapport per brev (100 kr):	Önskar faktura per brev (100 kr):

Information om provet							
För Jordart, Årets gröda samt Fjölårets gröda - använd kod (se baksida)							
	Provmärkning	Jordart	Årets gröda	Fjölårets gröda	Skiftets storlek (ha)	Provtagn. djup	Provtagn. datum
1							
2							
3							
4							

Välj analyspaket (sätt kryss) För mer info, se baksida				
1	2	3	4	
				Potatiscystnematod (314)
				Betcystnematod (201)
				Alla cystnematoder (200)
				Nematodstatus
				Frilevande nematoder (BKA)
				Frilevande nematoder + Longidorus och Xiphinema (BK1)
				Frilevande nematoder + alla cystnematoder (BK2)
				Frilevande nematoder + Longidorus och Xiphinema + alla cystnematoder (BK3)
				Inkubation av separata rottdelar (främst rotsårs- och rotgallnematoder)
				Vitmögel (Sclerotium cepivorum) (11)
				Artbestämning av Globodera ssp. (potatiscystnematoder) vid förekomst (1) Endast som tillägg till Potatiscystnematoder

Rådgivning önskas, ange grödkoderna (se baksida)	
Max 5 grödor: Ej möjligt för potatiscystnematoder.	

Adress för inskick av prov	
Brev skickas till Boxadressen: Eurofins Agro Testing Sweden AB, Box 9024 291 09 KRISTIANSTAD	Paket skickas med företagsutlämning: Eurofins Agro Testing Sweden AB, Estrids väg 1 291 65 KRISTIANSTAD
Observera att vi inte kan hämta paket på utlämningsställen!	

Allmänna villkor för Eurofins tjänster: www.eurofins-agro.com/se/allmanna-villkor

Analysresultaten kan komma att användas i underlag för statistik och forskning, som kartlägger och utvecklar svenskt lantbruk.

Testing for Life

Provtagningsinformation

Jordartskod (Fyll i koden för jordart på följesedeln)

Kod	Jordart
0	Kalkhaltig jord
10	Sand
20	Mo- och mjäljord
30	Lerjord
62	Mulljord

Provtagning

- Dela upp skiftet i områden
- Ta 1–3 prov per hektar, ha.
1 per ha för spannmål, vall
3 per ha för trädgårdsgrödor
- Ta ut prover i en rät linje i körriktningen på skiftet
- Ta ut 60–70 stick och blanda (provdjup 0-25cm)
- Fyll plastpåsen med 1–1,5L jordPotatiscystnematoder (303): ta ut 30 stick och blanda(provdjup, 0-25cm). Skicka in 600ml jord per prov.

Kom ihåg!

- Ta aldrig ut prov under torra förhållanden
 - Bästa tidpunkt för uttag är efter skörd på aktuellt skifte
 - Under växtfasen rekommenderas att förutom jord, även skicka in rottdelar för inkubation.
 - Kompromissa aldrig beträffande provtagningstäthet.
- Det är bättre att ta ut rekommenderat antal prov på en begränsad yta än få prov på en stor areal.

Möjliga grödor för rådgivning

Rådgivningen består av uppskattad risk för skador på grödan baserat på resultatet av analysen av jordkulturen om detta är tillgängligt.

Kod	Gröda	Kod	Gröda
SMS	Majs	CSA	Matpotatis
HVR	Havre	FBA	Industripotatis
WTR	Råg	PAA	Utsädespotatis
ZMG	Vårkorn	VDB	Foderbeta
WTG	Höstkorn	SKB	Socketbeta
ZMT	Vårmete	KZD	Raps
WTT	Höstmete	LZN	Lusern
KVR	Klöver	WPN	Morot
RSP	Vall (gräs)	PRI	Purjolök
APL	Äpple	ZUE	Lök
BKG	Tall	ABE	Jordgubbar

Förklaring av tilläggsanalyser

Inkubation: Analys av det organiska materialet som finns i jorden. Nematoderna extraheras från det organiska materialet (huvudsakligen rötter) under två veckors tid. De endoparasitära nematoderna som lever i rötterna ger en bättre bild av skadeläget med hjälp av denna metod.

Rottdelar: När ett prov blir uttaget under växtperioden bör även rottdelar och rotmassa skickas in från den aktuella växten då förekomsten av endoparasitära nematoder ofta är stor där.

Schema över grödor och nematoder

Kod	Gröda	Nematoders skadeverkningar			Rekommenderat analyspaket	
Spannmål och gräs		Frilevande nematoder	LX*	Cystnematoder	Frilevande nematoder	Cystnematoder
SMS	Majs	X		X	BK2	200
HVR	Havre	X		X	BK2	200
WTR	Råg	X		X	BK2	200
ZMG	Vårkorn	X		X	BK2	200
WTG	Höstkorn	X		X	BK2	200
ZMT	Vårmete	X		X	BK2	200
WTT	Höstmete	X		X	BK2	200
KVR	Klöver	X		X	BK2	200
RSP	Vall (gräs)	X	X	X	BK3	200
Övriga grödor		Frilevande nematoder	LX*	Cystnematoder	Frilevande nematoder	Cystnematoder
CSA	Potatis (konsument)	X		X	BK2	303
FBA	Stärkelsepotatis (industri)	X		X	BK2	303
PAA	Sättpotatis	X		X	BK2	303
VDB	Foderbetor	X		X	BK2	201
SKB	Socketbetor	X		X	BK2	201
KZD	Raps	X		X	BK2	200
LZN	Lusern	X		X	BK2	200
WPN	Morot	X	X	X	BK3	200
PRI	Purjolök	X	X		BK1	
ZUE	Gul lök	X			BKA	
Plantskola och fruktodling		Frilevande nematoder	LX*	Cystnematoder	Frilevandenematoder	Cystnematoder
ABE	Jordgubbar	X			BK1	
APL	Äpple	X			BKA eller BKP	
BKG	Tall	X			BKA eller BKP	

* Longidorus och Xiphinema (LX) är inte speciellt vanliga bland jordgubbsgrödor. De är känsliga för jordbearbetning och förekommer oftare i ostörd jord. Odling av känsliga grödor där det tidigare varit vall ökar risken för LX-nematoder. Dessa nematoder orsakar störst skada i jordgubbar och björnbär (karantänstatus i EU) och i förökningsmaterial för export så som prydnadsväxter och blomsterlök.

Kontakta oss gärna om du har frågor om analyser:

Telefon: 010-490 8410 | **Mail:** agroSE@ftn.eurofins.com | **Web:** eurofins-agro.com

Allmänna villkor för Eurofins tjänster: www.eurofins-agro.com/se/allmanna-villkor

Analysresultaten kan komma att användas i underlag för statistik och forskning, som kartläggning och utvecklar svenskt lantbruk.